



العمر	اللقاح														
	بالاسابيع		حديثي الولادة			الرُّصَع			الاطفال			المراهقين			البالغين
	6	2	3	4	11-14	15-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-17	18	من عمر 18	من عمر 60	
			U4		U6	U7	U7A/8	U9	U10	J1					
الكزاز		G1	G2	G3	G4	N	N	A1	N	A2			A ⁹		
الحنثاق		G1	G2	G3	G4	N	N	A1	N	A2			A ⁹		
السعال الديكي بيرتوسيس		G1	G2	G3	G4	N	N	A1	N	A2			A ⁹		
شلل الاطفال بوليومياليتيس		G1	G2 ①	G3	G4	N	N							N	
التهاب الكبد من النوع ب		G1	G2 ①	G3	G4	N	N								
المستدميه هايموفيليس انفلونزاي نوع ب		G1	G2 ①	G3	G4	N	N								
المكورة الرئوية ①		G1	G2	G3	G4	N	N								
روتافايرسيس		G1	G2	(G3)										S [ⓐ]	
المكورة السحائية المجموعه المصلية من النوع سي					G1 (من 12 شهرا)										
الحصبة					G1	G2	N							S [ⓑ]	
النكاف الحصبة الالمانية					G1	G2	N								
الحُمّاق فايرسيلا					G1	G2	N								
الانفلونزا الانفلونزا					G1	G2	N							S (سنويا)	
فيروس الورم الحليمي البشري هيومين بايلومافيروس														N [ⓐ] G2 [ⓑ] G1 [ⓐ]	

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

- ① هذه الجرعة غير مطلوبة عند استخدام لقاح احادي التكافؤ.
- ② يجب القيام بالتلقيحات للمرة الاولى من عمر ستة اسابيع. وبحسب نوع اللقاح، يتطلب ان يُعطى على شكل جرعتين او ثلاثة جرعات على فترات تتباعد عن بعضها باربعة اسابيع على الاقل.
- ③ يوصى اعطاء اللقاح ذو الجرعة الواحدة الذي يحتوي على لقاح البوليساكرين، التلقيح المعزز لحالات معينة فقط.
- ④ يعطى اللقاح ذو الجرعة الواحدة للاشخاص الذين تتراوح اعمارهم 18 سنة، الذين لهم وضع تلقيحي غير واضح والذين ولدوا بعد عام 1970 ولم يتم تلقيحهم قبلاً او كانوا قد تلقوا تلقيحاً واحداً في طفولتهم. من المفضل تلقيحهم بلقاح النكاف/الحصبة/الحصبة الالمانية (ام ام ار).
- ⑤ التلقيح يستلزم التقييم لتراوح اعمارهم بين 9 أو 13 أو 14 سنوات (اعتماداً على مادة اللقاح). لمعرفة عدد جرعات اللقاح انظر وصف المعلومات!
- ⑥ يعطى اللقاح المعزز للكزاز والحنثاق (تي دي) كل عشرة سنوات. ويعطى اللقاح التالي في موعده بجرعة واحدة مكونة من الكزاز/الحنثاق/السعال الديكي اللاخوي (تي دي اي بي) أو، ان استدعى ذلك، على شكل مزيج من الكزاز/الحنثاق/السعال الديكي اللاخوي - لقاح شلل الاطفال الغير مُنشط (تي دي اي بي - اي بي بي).
- ⑦ يتلقى الأطفال المبتسرين جرعة لقاح إضافية عند عمر ثلاثة أشهر، أي ما يعادل 4 جرعات كمجموع كلي.

ملاحظات توضيحية

G	التلقيحات الاساسية (لغاية 4 جرعات من لقاح ج1 - ج4)
S	التلقيحات النموذجية
A	التلقيحات المعززة
N	التلقيحات اللحفية (تلقيحات اساسية لكل من لم يتم تلقيحه قبلاً أو لتكملة سلسلة التلقيحات الناقصة)
U	الفحص التشخيصي المبكر
J	فحص الشباب (ج أي من عمر 12-14 سنة)