

CALENDAR PENTRU VACCINARE

Vaccinările trebuie să fie administrate cât mai timpuriu posibil.
O evaluare a stadiului vaccinărilor este importantă la orice vârstă.
Orice vaccinări care lipsesc trebuie administrate imediat, conform recomandărilor pentru grupa de vârstă respectivă.

Recomandările Comitetului
German Permanent pentru vaccinare
(STIKO), 2016/17.
www.stiko.de

ROBERT KOCH INSTITUT



Sprache: Rumänisch

VÂRSTĂ	(în săptămâni)	Nou-născuți			Sugari		Copii			Adolescenți		Adulți	
	6	2	3	4	11-14	15-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-17	de la 18	la 60
			U4		U6	U7	U7A/8	U9	U10	J1			
Tetanos		G1	G2	G3	G4	N	A1	N	A2	A (la fiecare 10 ani, f) N dacă este necesară			
Difterie		G1	G2	G3	G4	N	A1	N	A2	A (la fiecare 10 ani, f) N dacă este necesară			
Tuse convulsivă Pertussis		G1	G2	G3	G4	N	A1	N	A2	A f (N dacă este necesară)			
Polio Poliomielită		G1	G2 ^a	G3	G4	N			A1	N (dacă este necesară)			
Hepatită B		G1	G2 ^a	G3	G4	N							
Hib <i>Haemophilus influenzae de tip b</i>		G1	G2 ^a	G3	G4	N							
Pneumococcus ^g		G1		G2	G3	N						S ^c	
Rotavirusuri	G1 ^b	G2	(G3)										
Meningococcus Serogrup C					G1 (de la 12 luni)		N						
Pojar					G1	G2	N					S ^d	
Oreion Rubeolă					G1	G2	N						
Varicelă					G1	G2	N						
Gripă												S (anual)	
HPV Virusuri Papiloma uman							G1 ^e	G2 ^e	N ^e				

Datele următoarelor vaccinări



Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

NOTE EXPLICATIVE

- G** IMUNIZARE DE BAZĂ (în până la 4 doze de vaccin G1-G4)
- S** IMUNIZARE STANDARD
- A** IMUNIZARE DE RAPEL
- N** IMUNIZAREA PERSOANELOR NEVACCINATE ANTERIOR (imunizare de bază pentru orice persoană care nu a fost încă vaccinată sau finalizarea unei serii nefinalizate de vaccinări)
- U** Examinarea pentru recunoaștere timpurie
- J** Examinarea tinerilor (J1 cu vârsta cuprinsă între 12 și 14 ani)

- a** Această doză nu este necesară la folosirea unui vaccin monovalent.
- b** Prima vaccinare trebuie făcută deja de la vârsta de 6 săptămâni, iar în funcție de vaccinul folosit sunt necesare 2 sau 3 doze administrate la un interval de cel puțin 4 săptămâni între ele.
- c** O vaccinare singulară cu vaccin polizaharidic, imunizarea de rapel este indicată doar în cazul recomandărilor specifice.
- d** O vaccinare singulară pentru toți indivizii născuți după anul 1970 (≥ 18ani), cu un stadiu neclar al vaccinării, care nu au fost imunizați, sau cărora li s-a administrat doar un singur vaccin când erau copii. De preferat cu un vaccin MMR (antirubeolă și antipojar).

- e** Vaccinare standard la fete cu vârsta de 9-13, respectiv 9-14 ani (în funcție de vaccinul folosit). Pentru dozele de vaccin vezi informațiile de specialitate!
- f** Imunizare de rapel cu vaccin diftero-tetanic la fiecare 10 ani. Următorul vaccin diftero-tetanic (Td) necesar o singură dată ca vaccin Diftero-Tetano-Pertussis (Tdap), respectiv ca vaccin combinat Tdap-IPV (antipoliomielitic), dacă există recomandare în acest sens.
- g** Copiii prematuri primesc o doză suplimentară de vaccin la vârsta de trei luni, și anume un total de 4 doze.