



Informations sur les agents pathogènes chez l'homme – Le vaccin protège !

Qu'est-ce que la coqueluche ?

La coqueluche (*pertussis*) est déclenchée par des bactéries et est une maladie hautement contagieuse. La coqueluche est une des infections les plus répandues des voies respiratoires. L'agent pathogène de la coqueluche produit des toxines qui attaquent les muqueuses des voies respiratoires. En Allemagne, la plupart des enfants sont vaccinés contre la coqueluche. La maladie touche donc de plus en plus de jeunes et d'adultes qui n'ont pas été suffisamment vaccinés.

Comment la coqueluche se transmet-elle ?

D'homme à homme

Les agents pathogènes de la coqueluche se transmettent d'homme à homme par voie orale. Les bactéries se propagent par voie aérienne, lorsque le malade tousse, éternue ou parle, il propage des gouttelettes du rhino-pharynx à une distance pouvant atteindre 1 mètre. Une personne saine risque ainsi d'inspirer les bactéries. La plupart des contacts avec une personne malade contamine la personne saine. Il est possible de neutraliser les agents pathogènes en vaccinant la personne saine. La personne vaccinée ne tombe pas malade mais elle peut néanmoins propager et transmettre les bactéries.

Quels sont les symptômes de la maladie ?

La coqueluche se déroule en général en trois phases:

1. Au début, le patient présente pendant 12 semaines les symptômes d'un rhume, avec toux et sensation de fatigue et, rarement, de la fièvre.

2. Commence ensuite la phase de toux à qui la maladie doit son nom. Il s'agit d'une toux caractéristique, longue est sèche. Le patient a des quintes de toux convulsives, il reprend ensuite une inspiration rauque, qui évoque le chant du coq. Les quintes de toux, nombreuses, sont très éprouvantes. Elles surviennent surtout la nuit, moins le jour, et se terminent par une expectoration de glaires épaisses et par des vomissements. Le patient n'a pas d'appétit et ne dort pas. Il a rarement de la fièvre. Les nouveau-nés et nourrissons risquent l'arrêt respiratoire. La maladie dure en règle générale 4 à 6 semaines.

3. Au cours de la phase de récupération qui dure 6 à 10 semaines, les quintes de toux se font plus rares. Cependant, l'air froid, une fatigue physique ou le tabagisme peuvent provoquer des quintes de toux des mois après.

Chez les jeunes et les adultes, la toux dure généralement plus longtemps, sans les quintes de toux caractéristiques. Ce schéma atypique rend le diagnostic difficile. Le risque de contamination est alors plus élevé, puisque le patient n'est pas déclaré.

Les complications se présentent surtout au cours de la première année. Complications possibles:

- ▶ Pneumonie et otite, très rarement convulsions
- ▶ Plus rarement, la maladie peut endommager le cerveau suite à un manque d'oxygène. Cela peut se produire lors d'une quinte de toux avec une apnée. Éventuelles séquelles définitives : paralysies, troubles de la vision, l'audition ou troubles neurologiques. Cela concerne notamment les nouveau-nés de moins de 6 mois.

Quand la maladie se déclare-t-elle et combien de temps est-elle contagieuse ?

Les premiers symptômes apparaissent généralement entre 7 et 10 jours après contamination, parfois au bout de 3 semaines. Le patient est contagieux peu avant l'apparition des symptômes. Le risque de contamination est à son paroxysme au moment du rhume, avant l'apparition des quintes de toux. Il dure jusqu'à 3 semaines après l'apparition de la toux. Les nourrissons peuvent expectorer l'agent pathogène pendant plus longtemps. Un traitement antibiotique de la coqueluche permet de réduire la contagion au bout de 5 jours de traitement.

Qui est particulièrement vulnérable ?

La coqueluche peut être mortelle pour les nouveau-nés. Ils ne disposent d'aucune défense immunitaire contre la coqueluche ni d'une immunité postnatale. Les nouveau-nés peuvent ainsi être contaminés dès leur naissance. Le vaccin est la seule protection efficace.

La coqueluche peut toucher n'importe qui. En Allemagne, la coqueluche touche de plus en plus de jeunes et d'adultes non vaccinés. Ils représentent un foyer d'infection notamment pour les nouveau-nés et les enfants en bas âge et pour les personnes âgées et les personnes malades.

Que faire en cas de contamination ?

- ▶ Les patients doivent être isolés dans une pièce séparée pour ne contaminer personne et surtout ne pas être en contact avec des nouveau-nés, enfants en bas âge ou séniors.
- ▶ Les nouveau-nés de moins de 6 mois et les personnes gravement malades atteints de coqueluche sont généralement soignés en hôpital. Il est alors possible de prévenir à temps les apnées dangereuses.





Informations sur les agents pathogènes chez l'homme – Le vaccin protège !

Que faire en cas de contamination ?

- ▶ Avant de prendre des médicaments, demandez conseil à votre médecin. Il vous prescrira un antibiotique, le cas échéant. Lorsqu'il est prescrit à temps, il peut empêcher ou diminuer la maladie lors de la première phase, celle de la toux. Si les quintes de toux ont commencé, l'antibiotique ne pourra pas réduire la durée de la maladie. Ils permettent cependant de réduire la durée de la contagion et de réduire les risques d'épidémie.
- ▶ Le patient doit veiller à un environnement calme, boire beaucoup afin de soulager la toux sèche. Étant donné que la toux peut provoquer des haut-le-cœur ou des vomissements, il est préférable de prévoir des repas légers répartis sur la journée.
- ▶ Pendant les quintes de toux, placer les enfants assis, la tête légèrement en avant.
- ▶ Afin de prévenir une épidémie, la maladie est soumise aux réglementations de la loi sur la protection contre les infections. Les enfants et adultes atteints de coqueluche ne doivent en aucun cas se rendre dans des lieux publics, à l'école ou à la maternelle. Le patient atteint de coqueluche ne pourra retourner en collectivité qu'au bout de 5 jours après le début du traitement antibiotique, si son état le lui permet, ou bien 3 semaines après l'apparition de la toux.
- ▶ Si vous soupçonnez un cas de coqueluche, prévenez votre médecin avant votre visite, afin que le cabinet puisse prendre les mesures de protection nécessaires.

Comment me protéger ?

Il existe un vaccin contre la coqueluche. La STIKO (commission allemande permanente de vaccination) vous recommande:

- ▶ **Pour les nouveau-nés**, un vaccin en 4 prises, réparties entre le 2^e, 3^e, 4^e, 11^e et le 14^e mois. La coqueluche pouvant être mortelle pour les nouveau-nés, il est recommandé de les vacciner le plus tôt possible. Les vaccins pourront, le cas échéant, être administrés lors des examens courants.
- ▶ **Enfants et adolescents**: un vaccin de rappel entre 5 et 6 ans et entre 9 et 17 ans.
- ▶ **Adultes**: se font vacciner contre le tétanos et la diphtérie en combinaison avec un vaccin contre la coqueluche. Cela est valable également lors d'un vaccin contre le tétanos suite à une blessure.
- ▶ **Pour les femmes en âge d'enfanter** et pour les parents, grands-parents, nourrices et autres personnes en contact étroit avec le nouveau-né, dans la mesure où ces personnes n'ont pas été vaccinées au cours des 10 dernières années.
- ▶ Il en est de **même pour le personnel en milieu médical et en collectivité** si elles n'ont pas été vaccinées contre la coqueluche au cours des 10 dernières années.

Les patients de tous âges peuvent avoir la maladie plusieurs fois. La protection immunitaire après la maladie tient 7 à 20 ans et après un vaccin, 3,5 à 12 ans.

Après un contact avec une personne contaminée:

- ▶ Toute personne non vaccinée devra suivre un traitement antibiotique préventif pour que la maladie ne se déclare pas.
- ▶ Une personne vaccinée peut contaminer d'autres personnes. En cas de contact étroit avec des nouveau-nés ou des enfants en bas âge non vaccinés, vous devrez suivre un traitement antibiotique.

Où puis-je m'informer ?

L'administration de santé locale se tient à votre disposition pour toute question. La coqueluche étant une maladie devant être déclarée, elle vous fournira des informations sur la situation actuelle et dispose d'une grande expérience en la matière.

Vous trouverez des informations sur cette maladie sur le site web de l'Institut Robert Koch (www.rki.de/pertussis).

Vous trouverez des informations sur la protection par la vaccination sur la page du Centre fédéral pour l'éducation à la santé, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (www.impfen-info.de).



STEMPEL

Éditeur :

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Cologne.
Tous droits réservés.

Rédigé en collaboration avec le Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes e.V. (fédération allemande des médecins de la santé publique) et avec l'approbation de l'Institut Robert Koch.

Ces informations publiques peuvent être consultées et téléchargées gratuitement sur le site web

www.infektionsschutz.de.

